

FRUCTOsolv®

Wyrób medyczny



FRUCTOsolv® 30 kapsułek

FRUCTOsolv® 60 kapsułek

Wyrób medyczny zawierający izomerazę ksylozy.

Przeznaczony do łagodzenia objawów związanych z zaburzeniami wchłaniania fruktozy.

FRUCTOsolv® · Jedyny preparat na rynku ułatwiający prawidłowy rozkład fruktozy w organizmie. Łagodzi objawy takie jak:

- nudności i wymioty,
- bóle brzucha, biegunki,
- wzdęcia, oddawanie nadmiernej ilości gazów,
- brak łaknienia, czy wahania wagi i wzrostu

Skład:

Skład preparatu	mg/kapsułkę
Izomeraza ksylozy	30,23 mg

Tabela wartości odżywczych:

Panel żywieniowy	na kapsułkę	Na 100 g
Białko	30,23 mg	11,76 g
Węglowodany	30,32 mg	11,76 g
Tłuszcze	<0,1 mg	<0,1 g
Wartość energetyczna	0,24 kcal/kaps. 1,02 kJ/kaps.	94,80 kcal/100g 396,91 kJ/100g

Sposób użycia: Przyjmować od 1 do 2 kapsułek, popijając wodą, 15 minut przed spożyciem posiłków zawierających fruktozę do 3 razy na dobę. Ponadto należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Składniki: substancja czynna: izomeraza ksylozy; substancja stabilizująca: celuloza mikrokrystaliczna; otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza; substancja stabilizująca: maltoza; substancja glazurująca: szelak; substancja stabilizująca: hydroksypropyloceluloza; nośnik: siarczan amonu; substancja zagęszczająca: poliwinylpolipirrolidon; substancja przeciwbrylająca: talk; substancja zagęszczająca: modyfikowana skrobia kukurydziana, karboksymetyloceluloza; substancja utrzymująca wilgoć: gliceryna; regulator kwasowości: węglan sodu; barwnik kapsułki: dwutlenek tytanu.

Ważne informacje: Chorzy na cukrzycę muszą obliczać zawartość fruktozy w pokarmach, podobnie jak zawartość glukozy, dlatego powinni przyjmować FRUCTOsolv[®] wyłącznie pod nadzorem lekarza. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz dzieci i młodzież mogą stosować FRUCTOsolv[®] wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Kapsułek nie powinny przyjmować osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na izomerazę ksylozy lub na którykolwiek z pozostałych składników wyrobu.

Wyrób nie jest odpowiedni dla osób z dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Dostępne opakowania: 30 i 60 kapsułek

Informacji o produkcji udziela: Stada Poland Sp. z o.o., Al. 3 maja 6, 05-501 Piaseczno, tel.: +48 22 737 79 20